arXiv:1407.1139v1 [math.FA] 4 Jul 2014

V. F. Babenko, O. V. Kovalenko

On interpolation and extremal properties of periodic perfect splines

Abstract

Existing and extremal property of periodic perfect spline, which interpolates given function in the mean were proved.

Denote by C^m ($m \in \mathbb{Z}_+$) the space of m times continuously differentiable (continuous when $m = 0$) 2π-periodic functions; denote by L_∞ the space of all measurable 2π-periodic functions with finite norm $\|f\| = \|f\|_\infty$. For $r \in \mathbb{N}$ denote by L^r_∞ the space of functions $f \in C$ such that $f^{(r-1)}$ is absolutely continuous and $f^{(r)} \in L_\infty$.

For $r \in \mathbb{N}$ the function $s(t) \in C^{r-1}$ will be called a *spline* of order r with knots in the points

$$t_0 < t_1 < \ldots < t_n < t_{n+1} := t_0 + 2\pi, \tag{1}$$

if on each interval $[t_i, t_{i+1}]$, $i = 0, 1, \ldots, n$, $s(t)$ coincides with restriction to this interval of an algebraic polynomial of order less than or equal to r.

Spline $s(t)$ of the order r with knots in points (1) will be called *perfect* if $s^{(r)}(t) = (-1)^i\epsilon$, $\epsilon \in \{1, -1\}$, $t \in (t_i, t_{i+1})$, $i = 0, \ldots, n$.

For $r, n \in \mathbb{N}$ denote by Γ^r_n the set of 2π-periodic perfect splines of the order r with less than or equal to n knots.

Perfect splines play important role in exact solution of many extremal problems of approximation theory (see for example [1] and [2]).

The main result of this work is the following theorem.

Theorem 1 *Let $r, m \in \mathbb{N}$, $\varphi_k(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — integrable even functions with compact support $[-\varepsilon_k, \varepsilon_k]$, positive on $(-\varepsilon_k, \varepsilon_k)$ and such, that*

$$\int_{-\varepsilon_k}^{\varepsilon_k} \varphi_k(x)dx = 1,\ k = 1, \ldots, 2m + 1.$$

Let also the numbers $0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{2m+1} < 2\pi$ such, that supports $[x_k - \varepsilon_k, x_k + \varepsilon_k]$ of the functions $\varphi_k(x - x_k)$ be pairwise disjoint

and are contained in $[0, 2\pi)$, $k = 1, \dots, 2m+1$, *be given. Then for every function* $f \in L^r_\infty$ *there exist a number* ξ *and a spline* $s(t) \in \xi\Gamma^r_{2m}$ *such, that*

$$\int\limits_{x_k-\varepsilon_k}^{x_k+\varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k)s(x)dx = \int\limits_{x_k-\varepsilon_k}^{x_k+\varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k)f(x)dx,\ k = 1, \dots, 2m+1.$$

Moreover

$$\|s^{(r)}\|_\infty = |\xi| \le \|f^{(r)}\|_\infty. \tag{2}$$

From theorem 1, in particular, the possibility of simple and multiple interpolation by periodic perfect splines follows.

Theorem 2 *Let* $r, m \in \mathbb{N}$, $0 \le x_1 < x_2 < \ldots < x_l < 2\pi$, $k_1, \dots, k_l \le r-1$ *— integer non-negative numbers such that* $\sum_{j=1}^{l}(k_j+1) = 2m+1$. *Then for every function* $f \in L^r_\infty$ *there exist a number* ξ *and a spline* $s(t) \in \xi\Gamma^r_{2m}$ *such that*

$$s^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i),\ j = 0, \dots, k_i;\ i = 1, \dots, l.$$

Moreover, the extremal property (2) *holds.*

In particular, if numbers $0 \le x_1 < x_2 < \ldots < x_{2m+1} < 2\pi$ *and a function* $f \in L^r_\infty$ *are given, then there exist a number* ξ *and a spline* $s(t) \in \xi\Gamma^r_{2m}$ *such that*

$$s(x_i) = f(x_i),\ i = 1, \dots, 2m+1.$$

Moreover, the extremal property (2) *holds.*

Theorem 2 gives periodic analogue of the results, that were achieved by S. Karlin [3, 4] in non-periodic case. The methods of the proof, that we use, are much simplier than those, that were used by S. Karlin, and can be used in solution of other problems.

We will show the main steps in the proof of the theorem 1. Theorem 2 can be proved with the help of theorem 1 readily.

Below we will denote by $*$ the operation of convolution for 2π-periodic functions. Let $f \in C$. Denote by $\nu(f)$ the number of sign changes of the function f on the period. For $\varepsilon > 0$ and $x \in \mathbb{R}$ denote by

$$A_\varepsilon(x) := \frac{1}{2\pi}\sum_{j=-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{ijx}}{ch\varepsilon j}.$$

Note several properties of the kernel A_ε. If $f \in C$, then $(A_\varepsilon * f)$ is analytical function on real line (see. [5],[6]; see also [7], §3); $(A_\varepsilon * f)$ uniformly converges to the function f when $\varepsilon \to 0$ on real line; $\nu(A_\varepsilon * f) \leq \nu(f)$ (see for example [8]); A_ε is even; $\int_{\mathbb{R}} A_\varepsilon(x)dx = 1$. Below we will denote by $B_r(t)$, $r \in \mathbb{N}$, the Bernoulli kernel of order r (see for example [1], §3.1).

Set $C_k := \int\limits_{x_k-\varepsilon_k}^{x_k+\varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k)f(x)dx$, $k = 1, 2, \ldots, 2m + 1$. For $\varepsilon > 0$ consider the extremal problem

$$\int\limits_0^{2\pi} \left| c + \sum_{k=1}^{2m+1} c_k (A_\varepsilon * B_r * \varphi_k)(x - x_k) \right| dx \to \min \tag{3}$$

under conditions

$$\sum_{k=1}^{2m+1} c_k C_k = 1, \tag{4}$$

$$\sum_{k=1}^{2m+1} c_k = 0. \tag{5}$$

The convolution with the kernel A_ε is needed to make the integrated functions analytic. This ensures that the function being minimized is continuously differntiable with respect to parameters c and c_k, $k = 1, \ldots, 2m + 1$. It is easy to prove that the minimum in the extremal problem (3) – (5) exists.

Consider the Lagrange function:

$$L := \eta \int\limits_0^{2\pi} \left| c + \sum_{k=1}^{2m+1} c_k (A_\varepsilon * B_r * \varphi_k)(x - x_k) \right| dx + \lambda \left(\sum_{k=1}^{2m+1} c_k C_k - 1 \right) + \mu \sum_{k=1}^{2m+1} c_k.$$

According to method of Lagrange multipliers (see for example [9], § 2), there exist numbers $\eta_\varepsilon, \lambda_\varepsilon, \mu_\varepsilon \in \mathbb{R}$ such that $\eta_\varepsilon^2 + \lambda_\varepsilon^2 + \mu_\varepsilon^2 \neq 0$ (we can count, for example, that $\eta_\varepsilon^2 + \lambda_\varepsilon^2 + \mu_\varepsilon^2 = 1$), and $c^\varepsilon, c_1^\varepsilon, c_2^\varepsilon, \ldots, c_{2m+1}^\varepsilon \in \mathbb{R}$, which fulfills the equalities (4) and (5) and such that

$$\eta_\varepsilon \int\limits_0^{2\pi} \operatorname{sgn} \left[c^\varepsilon + \sum_{k=1}^{2m+1} c_k^\varepsilon (A_\varepsilon * B_r * \varphi_k)(x - x_k) \right] dx = 0$$

and for $j = 1, 2, \ldots, 2m+1$

$$\eta_\varepsilon \int_0^{2\pi} \operatorname{sgn}\left[c^\varepsilon + \sum_{k=1}^{2m+1} c_k^\varepsilon (A_\varepsilon * B_r * \varphi_k)(x - x_k)\right] (A_\varepsilon * B_r * \varphi_j)(x - x_j)dx + \lambda_\varepsilon C_j + \mu_\varepsilon = 0.$$

Passing to the limit when $\varepsilon \to 0$ we get that there exist numbers η, λ, μ, $\eta^2 + \lambda^2 + \mu^2 = 1$, and a function $g(x)$, which is non-zero almost everywhere and such that $\nu(g) \le 2m$, for which $\eta \int_0^{2\pi} \operatorname{sgn} g(x)dx = 0$, and for $k = 1, 2, \ldots, 2m+1$

$$\eta \int_0^{2\pi} \operatorname{sgn} g(x)(B_r * \varphi_k)(x - x_k)dx + \lambda C_k + \mu = 0. \tag{6}$$

Assumption that $\eta = 0$ or $\lambda = 0$ leads to contradiction. This means that for the function $h(x) := (\operatorname{sgn} g * B_r)(x)$ we have $h^{(r)}(x) = \operatorname{sgn} g(x)$, and hence $h(x) \in \Gamma_{2m}^r$.

From (6) we get that for $k = 1, \ldots, 2m+1$

$$0 = \eta \int_0^{2\pi} \operatorname{sgn} g(x)(B_r * \varphi_k)(x - x_k)dx + \lambda C_k + \mu =$$

$$= (-1)^r \eta (\operatorname{sgn} g * B_r * \varphi_k)(x_k) + \lambda C_k + \mu = (-1)^r \eta (\varphi_k * h)(x_k) + \lambda C_k + \mu =$$

$$= (-1)^r \eta \int_{x_k - \varepsilon_k}^{x_k + \varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k) h(x)dx + \lambda C_k + \mu$$

(the last equality holds because the functions $\varphi_k(x)$ are even).

This means that the perfect spline $s(x) := -\frac{(-1)^r \eta h(x) + \mu}{\lambda}$ is desired.

We will show that $\|s^{(r)}\|_\infty \le \|f^{(r)}\|_\infty$ now. Suppose the contrary. Let $\|s^{(r)}\|_\infty > \|f^{(r)}\|_\infty$. Set $\delta(x) := s(x) - f(x)$. Then the function$\delta^{(r)}(x) = s^{(r)}(x) - f^{(r)}(x)$ can change the sign only in the knots of the spline $s(x)$, and hence $\nu(\delta^{(r)}) \le 2m$. Note that $\int_{x_k - \varepsilon_k}^{x_k + \varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k)\delta(x)dx = 0$, function $\delta(x)$ is non-zero on each interval in $[0; 2\pi)$ and $\varphi_k(x)$ are non-negative functions, $k = 1, \ldots, 2m+1$, and hence on each interval $(x_k - \varepsilon_k, x_k + \varepsilon_k)$ the function $\delta(x)$ changes sign. The supports of the functions $\varphi_k(x - x_k)$, $k = 1, \ldots, 2m+1$ are pairwise disjoint, and hence $\nu(\delta) \ge 2m+1$, which lead to contradiction. Theorem is proved.

References

[1] *Korneichuk N. P* Exact constants in approximation theory. — Moscow: Nauka — 1987. — 423 p. (in Russian).

[2] *Korneichuk N. P., Babenko V. F., Ligun A. A.* Extremal properties of polynomials and splines. — Kyiv: Nauk. Dumka. — 1992, — 304 p. (in Russian).

[3] *Karlin S.* Some variational problems on certain Sobolev spaces and perfect splines // Bull. Amer. Math. Soc. — 1973. — **79**, №1. — p. 124–128.

[4] *Karlin S.* Interpolation properties of generalized perfect splines and the solutions of certain extremal problems // I., Trans. Amer. Math. Soc.— 1975. — **206**.— p. 25–66.

[5] *Akhiezer N. I.* On best approximation of one continuous periodic functions // Dokl. AN USSR — 1937. — **17** (in Russian).

[6] *Akhiezer N. I.* On best approximation analytical functions // Dokl. AN USSR — 1938. — **18** (in Russian).

[7] *Nikolsky S. M.* Aproximation of functions by trigonometrical polygons in mean// Izv. AN USSR. Math. — 1946. — **10**, №3. — p. 207—256 (in Russian).

[8] *Mairhuber J. C., Schoenberg I. J., Williamson R. E.* On variation diminishing transformations of the Circle // Rend. Circ. Mat. Palermo. 1959. — **8**, №2. — p. 241—270.

[9] *Galeev E. M., Tikhomirov V. M.* Short course of extremal problems theory. — Moscow University . — 1983. — 209 p. (in Russian).

arXiv:1407.1139v1 [math.FA] 4 Jul 2014

УДК 517.5

В. Ф. Бабенко, О. В. Коваленко

Об интерполяционных и экстремальных свойствах периодических идеальных сплайнов

Аннотация

Доказано существование и экстремальное свойство периодического идеального сплайна, интерполирующего заданную функцию в среднем.

Пусть C^m ($m \in \mathbb{Z}_+$) обозначает пространство m раз непрерывно дифференцируемых (непрерывных при $m = 0$) 2π-периодических функций; через L_∞ будем обозначать пространство всех измеримых 2π-периодических функций с конечной нормой $\|f\| = \|f\|_\infty$. Для $r \in \mathbb{N}$ через L^r_∞ будем обозначать пространство функций $f \in C$ таких, что функция $f^{(r-1)}$ абсолютно непрерывна, а $f^{(r)} \in L_\infty$.

Для $r \in \mathbb{N}$ функцию $s(t) \in C^{r-1}$ назовем сплайном порядка r с узлами в точках

$$t_0 < t_1 < \ldots < t_n < t_{n+1} := t_0 + 2\pi, \tag{1}$$

если на каждом из промежутков $[t_i, t_{i+1}]$, $i = 0, 1, \ldots, n$, $s(t)$ совпадает с сужением на этот промежуток некоторого алгебраического многочлена степени не выше r.

Идеальным сплайном порядка r назовем сплайн $s(t)$ порядка r с узлами в точках (1), у которого $s^{(r)}(t) = (-1)^i\epsilon$, $\epsilon \in \{1, -1\}$, $t \in (t_i, t_{i+1})$, $i = 0, \ldots, n$.

Для $r, n \in \mathbb{N}$ обозначим через Γ^r_n множество 2π–периодических идеальных сплайнов порядка r с не более чем n узлами.

Идеальные сплайны играют важную роль при точном решении многих экстремальных задач теории аппроксимации (см., например, [1] и [2]).

Основным результатом данной работы является следующая теорема.

Теорема 1 *Пусть $r, m \in \mathbb{N}$, $\varphi_k(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — интегрируемые четные функции с компактными носителями $[-\varepsilon_k, \varepsilon_k]$, положительные на $(-\varepsilon_k, \varepsilon_k)$, и такие, что*

$$\int_{-\varepsilon_k}^{\varepsilon_k} \varphi_k(x)dx = 1,\ k = 1, \ldots, 2m + 1.$$

Пусть также числа $0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{2m+1} < 2\pi$ *таковы, что носители* $[x_k - \varepsilon_k, x_k + \varepsilon_k]$ *функций* $\varphi_k(x - x_k)$ *попарно не пересекаются и содержатся в* $[0, 2\pi)$, $k = 1, \ldots, 2m+1$. *Тогда для любой функции* $f \in L^r_\infty$ *существуют число* ξ *и сплайн* $s(t) \in \xi\Gamma^r_{2m}$ *такие, что*

$$\int\limits_{x_k-\varepsilon_k}^{x_k+\varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k)s(x)dx = \int\limits_{x_k-\varepsilon_k}^{x_k+\varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k)f(x)dx,\ k = 1, \ldots, 2m+1.$$

При этом

$$\|s^{(r)}\|_\infty = |\xi| \le \|f^{(r)}\|_\infty. \tag{2}$$

Из теоремы 1, в частности, следует возможность обыкновенной и кратной интерполяции периодическими идеальными сплайнами.

Теорема 2 *Пусть* $r, m \in \mathbb{N}$, $0 \le x_1 < x_2 < \ldots < x_l < 2\pi$, $k_1, \ldots, k_l \le r-1$ *– целые неотрицательные числа такие, что* $\sum_{j=1}^{l} (k_j + 1) = 2m + 1$. *Тогда для любой функции* $f \in L^r_\infty$ *существуют число* ξ *и сплайн* $s(t) \in \xi\Gamma^r_{2m}$ *такие, что*

$$s^{(j)}(x_i) = f^{(j)}(x_i),\ j = 0, \ldots, k_i;\ i = 1, \ldots, l.$$

При этом выполняется экстремальное свойство (2).

В частности, если заданы числа $0 \le x_1 < x_2 < \ldots < x_{2m+1} < 2\pi$ *и фукнция* $f \in L^r_\infty$, *то существуют число* ξ *и сплайн* $s(t) \in \xi\Gamma^r_{2m}$ *такие, что*

$$s(x_i) = f(x_i),\ i = 1, \ldots, 2m+1.$$

При этом выполняется экстремальное свойство (2).

Теорема 2 дает периодический аналог результатов, которые в непериодическом случае были получены С. Карлиным [3, 4]. Методы доказательства, используемые нами, значительно проще тех, которые применял С. Карлин, и могут быть использованы для решения других задач.

Приведем основные этапы доказательства теоремы 1. Теорема 2 легко устанавливается с помощью теоремы 1.

Символом $*$ далее будем обозначать операцию свертки 2π - периодических функций. Пусть $f \in C$. Обозначим через $\nu(f)$ количество перемен знака f на периоде. Для $\varepsilon > 0$ и $x \in \mathbb{R}$ положим

$$A_\varepsilon(x) := \frac{1}{2\pi} \sum_{j=-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{ijx}}{\operatorname{ch} \varepsilon j}.$$

Отметим некоторые свойства A_ε. Если $f \in C$, то $(A_\varepsilon * f)$ – аналитическая функция на вещественной прямой (см. [5],[6]; см. также [7], §3); $(A_\varepsilon * f)$ равномерно сходится к f при $\varepsilon \to 0$ на вещественной прямой; $\nu(A_\varepsilon * f) \leq \nu(f)$ (см., напр., [8]); A_ε – четная функция; $\int_{\mathbb{R}} A_\varepsilon(x)dx = 1$. Всюду далее через $B_r(t)$, $r \in \mathbb{N}$ мы будем обозначать ядро Бернулли порядка r (см., например, [1], §3.1).

Положим $C_k := \int\limits_{x_k-\varepsilon_k}^{x_k+\varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k)f(x)dx$, $k = 1, 2, \ldots, 2m+1$. Для $\varepsilon > 0$ рассмотрим экстремальную задачу

$$\int\limits_0^{2\pi} \left| c + \sum_{k=1}^{2m+1} c_k (A_\varepsilon * B_r * \varphi_k)(x - x_k) \right| dx \to \min \tag{3}$$

при условиях

$$\sum_{k=1}^{2m+1} c_k C_k = 1, \tag{4}$$

$$\sum_{k=1}^{2m+1} c_k = 0. \tag{5}$$

Свертка с ядром A_ε нам нужна для того, чтобы подынтегральная функция была аналитической, а значит минимизируемая функция была непрерывно дифференцируемой по параметрам c и c_k, $k = 1, \ldots, 2m + 1$. Нетрудно доказать, что минимум в экстремальной задаче (3) – (5) существует.

Введем функцию Лагранжа:

$$L := \eta \int\limits_0^{2\pi} \left| c + \sum_{k=1}^{2m+1} c_k (A_\varepsilon * B_r * \varphi_k)(x - x_k) \right| dx + \lambda \left(\sum_{k=1}^{2m+1} c_k C_k - 1 \right) + \mu \sum_{k=1}^{2m+1} c_k.$$

Согласно методу неопределенных множителей Лагранжа (см. например, [9], §2), существуют числа $\eta_\varepsilon, \lambda_\varepsilon, \mu_\varepsilon \in \mathbb{R}$ такие, что $\eta_\varepsilon^2 + \lambda_\varepsilon^2 + \mu_\varepsilon^2 \neq 0$ (мы можем, например, считать, что $\eta_\varepsilon^2 + \lambda_\varepsilon^2 + \mu_\varepsilon^2 = 1$), и $c^\varepsilon, c_1^\varepsilon, c_2^\varepsilon, \ldots, c_{2m+1}^\varepsilon \in \mathbb{R}$, удовлетворяющие равенствам (4) и (5) такие, что

$$\eta_\varepsilon \int\limits_0^{2\pi} \operatorname{sgn} \left[c^\varepsilon + \sum_{k=1}^{2m+1} c_k^\varepsilon (A_\varepsilon * B_r * \varphi_k)(x - x_k) \right] dx = 0$$

и для $j = 1, 2, \ldots, 2m+1$

$$\eta_\varepsilon \int_0^{2\pi} \operatorname{sgn}\left[c^\varepsilon + \sum_{k=1}^{2m+1} c_k^\varepsilon (A_\varepsilon * B_r * \varphi_k)(x - x_k)\right] (A_\varepsilon * B_r * \varphi_j)(x - x_j)dx + \lambda_\varepsilon C_j + \mu_\varepsilon = 0.$$

С помощью предельного перехода при $\varepsilon \to 0$ отсюда выводится, что существуют числа η, λ, μ, $\eta^2 + \lambda^2 + \mu^2 = 1$, и функция $g(x)$, почти всюду отличная от нуля и такая, что $\nu(g) \le 2m$, для которых $\eta \int_0^{2\pi} \operatorname{sgn} g(x)dx = 0$, и для $k = 1, 2, \ldots, 2m+1$

$$\eta \int_0^{2\pi} \operatorname{sgn} g(x)(B_r * \varphi_k)(x - x_k)dx + \lambda C_k + \mu = 0. \tag{6}$$

Предположение о том, что $\eta = 0$ или $\lambda = 0$ приводит к противоречию. Это значит, что для функции $h(x) := (\operatorname{sgn} g * B_r)(x)$ имеем $h^{(r)}(x) = \operatorname{sgn} g(x)$, а значит $h(x) \in \Gamma_{2m}^r$.

Из (6) получаем, что для $k = 1, \ldots, 2m+1$

$$0 = \eta \int_0^{2\pi} \operatorname{sgn} g(x)(B_r * \varphi_k)(x - x_k)dx + \lambda C_k + \mu =$$

$$= (-1)^r \eta (\operatorname{sgn} g * B_r * \varphi_k)(x_k) + \lambda C_k + \mu = (-1)^r \eta (\varphi_k * h)(x_k) + \lambda C_k + \mu =$$

$$= (-1)^r \eta \int_{x_k - \varepsilon_k}^{x_k + \varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k)h(x)dx + \lambda C_k + \mu$$

(последнее равенство верно в силу четности $\varphi_k(x)$).

Это значит, что идеальный сплайн $s(x) := -\frac{(-1)^r \eta h(x) + \mu}{\lambda}$ является искомым интерполяционным сплайном.

Покажем, что $\|s^{(r)}\|_\infty \le \|f^{(r)}\|_\infty$. Предположим противное. Пусть $\|s^{(r)}\|_\infty > \|f^{(r)}\|_\infty$. Положим $\delta(x) := s(x) - f(x)$. Тогда $\delta^{(r)}(x) = s^{(r)}(x) - f^{(r)}(x)$ может менять знак только в узлах сплайна $s(x)$, а значит $\nu(\delta^{(r)}) \le 2m$. Так как $\int_{x_k - \varepsilon_k}^{x_k + \varepsilon_k} \varphi_k(x - x_k)\delta(x)dx = 0$, функция $\delta(x)$ не равна нулю тождественно ни на каком интревале из $[0; 2\pi)$ и $\varphi_k(x)$ – неотрицательная функция ($k = 1, \ldots, 2m+1$), то на каждом интервале $(x_k - \varepsilon_k, x_k + \varepsilon_k)$ функция $\delta(x)$ меняет знак. Поскольку носители функций $\varphi_k(x - x_k)$, $k = 1, \ldots, 2m+1$ попарно не пересекаются, то $\nu(\delta) \ge 2m+1$, что в силу периодичности функции δ приводит к противоречию. Теорема доказана.

Список литературы

[1] *Корнейчук Н. П.* Точные константы в теории приближения. — Москва: Наука. — 1987. — 423 с.

[2] *Корнейчук Н. П., Бабенко В. Ф., Лигун А. А.* Экстремальные свойства полиномов и сплайнов. — Киев: Наук. думка. — 1992, — 304 с.

[3] *Karlin S.* Some variational problems on certain Sobolev spaces and perfect splines // Bull. Amer. Math. Soc. — 1973. — **79**, №1. — P. 124–128.

[4] *Karlin S.* Interpolation properties of generalized perfect splines and the solutions of certain extremal problems // I., Trans. Amer. Math. Soc.— 1975. — **206**.— P. 25–66.

[5] *Ахиезер Н. И.* О наилучшем приближении одного класса непрерывных периодических функций // Докл. АН СССР. — 1937. — **17**.

[6] *Ахиезер Н. И.* О наилучшем приближении аналитических функций // Докл. Ак. Наук СССР. — 1938. — **18**.

[7] *Никольский С. М.* Приближение функций тригонометрическими полиномами в среднем // Изв. АН СССР. Сер. матем. — 1946. — **10**, №3. — С. 207—256.

[8] *Mairhuber J. C., Schoenberg I. J., Williamson R. E.* On variation diminishing transformations of the Circle // Rend. Circ. Mat. Palermo. 1959. — **8**, №2. — P. 241—270.

[9] *Галеев Э. М., Тихомиров В. М.*. Краткий курс теории экстремальных задач. — Издательство Московского университета. — 1983. — 209 с.